



TERMO DE REMESSA DE AMOSTRA AO LASFI

Página
01 de 02

ANEXO 01 – LASFI – FG 142 Termo de remessa da amostra ao LASFI

INDICAÇÕES POR ESPÉCIE BOTÂNICA, TAMANHO MÁXIMO DO LOTE, PESO MÍNIMO DA AMOSTRA MÉDIA E ANÁLISE DA PUREZA (RAS, 2025)

Nome comum	Espécie Botânica	Tamanho Máx do Lote (Kg)	Amostra Média	Análise Pureza
Abóbora/ Híbrida tetsukabuto	<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne x <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	10.000	350	180
Alface	<i>Lactuca sativa</i> L.	10.000	30	3
Alfafa	<i>Medicago sativa</i> L.	10000	50	5
Algodão	<i>Gossypium hirsutum</i> L.	25.000	1.000	350
Aveia amarela/aveia branca	<i>Avena sativa</i> L.	30.000	1.000	120
Aveia-perene	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl.	10.000	80	8
Aveia preta	<i>Avena strigosa</i> Schreb.	30.000	500	50
Azevém anual	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	10.000	60	6
Azevém perene	<i>Lolium perenne</i> L.	10.000	60	6
Brachiária decumbens	<i>Urochloa decumbens</i> (Stapf) R. D. Webster Sinon: <i>Brachiaria decumbens</i> Stapf	10000	200	10
Brachiária brizantha	<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A. Rich.) R. D. Webster Sinon: <i>Brachiaria brizantha</i>	10000	200	10
Brachiária humidicola	<i>Urochloa humidicola</i> (Rendle) Sinon: <i>Brachiaria humidicola</i> (Rendle) Schweick.	10000	200	10
Canola	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>Oleifera</i> Moench	10.000	70	7
Capim colônião	<i>Megathyrsus maximus</i> (Jacq.) B. K. Simon & S. W. L. Jacobs = <i>Panicum maximum</i>	10.000	25	2
Capim sudão	<i>Sorghum sudanense</i> (Pipa) Stapf	10000	250	25
Cebola	<i>Allium cepa</i> L.	10.000	80	8
Cenoura	<i>Daucus carota</i> L.	10.000	30	3
Centeio	<i>Secale cereale</i> L.	30.000	1.000	120
Cevada	<i>Hordeum vulgare</i> L.	30.000	1.000	120
Chicória	<i>Cichorium intybus</i> L.	10.000	50	5
Chicória/ Chicória crespa	<i>Cichorium endivia</i> L.	10.000	40	4
Coentro	<i>Coriandrum sativum</i> L.	10.000	40	4
Colza	<i>Brassica rapa</i> L. incluindo <i>Brassica campestris</i> L. var. <i>rapifera</i> Metzg.	10.000	70	7
Cornichão	<i>Lotus corniculatus</i> L.	10.000	30	3
Dátilo/ Grama	<i>Dactylis glomerata</i> L.	10.000	30	3
Ervilha, Ervilha torta	<i>Pisum sativum</i> L.	30.000	1.000	900
Ervilha forrageira	<i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i> var. <i>arvense</i> (L.) Poir	30.000	1.000	900
Ervilhaca comum	<i>Vicia sativa</i> L.	30.000	1.000	140
Ervilhaca peluda	<i>Vicia villosa</i> Roth	30.000	1.000	100
Feijão	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	30.000	1.000	700
Festuca alta	<i>Festuca arundinacea</i> Scherb.	10.000	50	5
Fumo/ Tabaco	<i>Nicotiniana tabacum</i> L.	10000	3	0,3
Girassol	<i>Helianthus annuus</i> L.	25.000	1.000	200
Lentilha	<i>Lens culinaris</i> Medikus	30.000	600	60
Linho	<i>Linum usitatissimum</i> L.	10.000	150	15
Milheto	<i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R. Br. Sinonímia: <i>Cenchrus americanus</i> L.;	10.000	150	15
Milho	<i>Zea mays</i> L.	40.000	1.000	900
Milho para Pipoca	<i>Zea mays</i> var. <i>everta</i> (Sturtev.) L.H. Bailey	40.000	1.000	900
Nabo	<i>Brassica napus</i> L.	10.000	100	10
Nabo forrageiro	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Sinon: <i>R. sativus</i> L. var. <i>oleiferus</i> Stokes	10.000	300	30
Rúcula	<i>Eruca sativa</i> Mill.	10.000	40	4
Salsa	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W. Hill = <i>Petroselinum sativum</i>	10.000	40	4
Soja	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	30.000	1.000	500
Sorgo	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	30.000	900	90
Tomate	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. = <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) H.Karst	10.000	15	7
Tremoço-branco	<i>Lupinus albus</i> L.	30.000	1000	450
Trevo-de-alexandria	<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	10.000	60	6
Trevo branco	<i>Trifolium repens</i> L.	10.000	20	2
Trevo incarnatum	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	10.000	80	8
Trevo vermelho	<i>Trifolium pratense</i> L.	10.000	50	5
Trigo	<i>Triticum aestivum</i> L. = <i>Triticum sativum</i> Lam.	30.000	1.000	120
Trigo duro	<i>Triticum durum</i> Desd.	30.000	1.000	120
Trigo mourisco/ Trigo sarraceno	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench.	10.000	600	60
Triticale	* <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	30.000	1.000	120